



موننسن سدیم ۱۰٪

پل کوکس®

ضد کوکسیدیوز / پودر گرانول مخلوط در دان

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:

موننسن سدیم ۱۰۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور، بوقلمون، گوساله، بره، گاو شیری و گاو گوشتی

مکانیسم اثر:

موننسن یک کوکسیدیواستات مونوآلان پلی‌اتر از گروه یونوفوره‌ها است که عمل ضدکوکسیدیوزی را برعلیه برخی از گونه‌های آیمریا انجام داده و برروی تروفوزوئیت‌ها در اولین مرحله تقسیم شیزوگونی تأثیر می‌گذارد.

موارد مصرف:

پل کوکس® به‌منظور کمک در کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی و پولت‌های تخم‌گذار تا سن ۱۶ هفتگی، که به وسیله آیمریا تنلا، آ.آسروولینا، آ.میوواتی، آ.برونتی، آ.ماکسیما و آنکاتریکس ایجاد می‌گردد، استفاده می‌شود. همچنین جهت کمک در کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در بوقلمون تا سن ۱۶ هفتگی که به‌وسیله آیمریا آدنوئیدوس، آیمریا مله اگریمیتیس و آیمریا گالوپاوونیس ایجاد می‌شود و در نشخوارکنندگان برای افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذا با پیش معده توسعه یافته (گوساله و بره از شیر گرفته) و در گاوهای شیری برای پیشگیری از کتوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اخطار: محدوده درمانی به دوز کشنده

[mg/kg, orally ۴۷±۲۸۴ = LD۵۰chicks] موننسن بسیار نزدیک است، بنابراین می‌بایست دوز دقیق و در سطوح توصیه‌شده مصرف گردد.

موارد منع مصرف: خوراک حاوی موننسن، در طیور تخم‌گذار، بوقلمون (بیشتر از ۱۶ هفته)، پرندگان آبزی، مرغ‌های شاخ‌دار و سایر گونه‌های پرندگان نباید مصرف گردد. برای اسب و سایر تک‌سمی‌ها منع مصرف دارد.

میزان و نحوه مصرف:

نحوه مصرف به صورت خوراکی و از طریق مخلوط کردن با خوراک است.

گونه هدف	موننسن سدیم به‌صورت خاص (پلی‌ایام)	پرمیکس پل کوکس (گرم در تن خوراک)	زمان مصرف
جوجه گوشتی	۱۲۰ - ۱۰۰	۱۲۰۰ - ۱۰۰۰	کل دوره پرورش تا ۳ روز قبل از کشتار
پولت‌های جایگزین تخمگذار	۱۲۰ - ۱۰۰	۱۲۰۰ - ۱۰۰۰	تا سن ۱۶ هفتگی
بوقلمون	۱۰۰ - ۶۰	۱۰۰۰ - ۶۰۰	تا سن ۱۶ هفتگی
بره و گوساله‌های پرواری	۱۰	۱۰۰	کل دوره پرورش
بره و گوساله‌های پرواری با کنسانتره و علوفه	۲۰ - ۱۰	۲۰۰ - ۱۰۰	به ترتیب در طی اولین (۴۰ الی ۵۰ روزگی و دومین دوره پرورش)
گاو شیری	۲/۵ گرم پل کوکس®	به ازای هر راس روزانه و در دو وعده مساوی	

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای به‌دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می‌شود ابتدا پرمیکس را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک، در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به‌دست آید.

تداخل دارویی: موننسن با داروهای تیامولین، اریتروماکسین، اولاندومایسین، سولفامزاتین (سولفادیامیدین)، سولفادیامتوکسین و سولفاکینوکسالیلین تداخل دارویی داشته و منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: در صورت مسمومیت حاد (مصرف بیش از دوز توصیه شده) ممکن است کاهش رشد و مسمومیت (به صورت از دست دادن اشتها، لرزش، فلجی اندام و مرگ) رخ دهد.

زمان پرهیز از مصرف: ۳ روز قبل از کشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتماً از لباس‌های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار استفاده نمایید. در صورت تماس پل کوکس® با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید

بسته بندی: فویل آلومینیومی سه لایه لامینت شده ۵ کیلوگرمی.



آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)